

OUTIL DE TRIAGE POUR LES USAGERS du CISSS CN

But : identifier la clientèle potentiellement infectieuse ou vulnérable.

QUESTIONNAIRE LORS DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ET LA JOURNÉE MÊME DU RENDEZ-VOUS
OU

SITUATION AUTRE QU'UN RENDEZ-VOUS

(Excepté pour l'urgence qui utilise l'outil d'aide à la décision pour les maladies infectieuses)

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2023/23-271-05W.pdf>

COVID-19		Oui	Non
Êtes-vous ?	<ul style="list-style-type: none"> • Immunosupprimé • Greffé d'organe solide • Usager d'hémo-oncologie 		
Si OUI, l'utilisateur et le TdeS doivent porter le masque de procédure²			
Avez-vous <u>UN</u> ou PLUSIEURS des symptômes suivants ?	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre • Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût • Toux (nouvelle ou aggravée) • Essoufflement • Difficulté à respirer • Mal de gorge • Congestion nasale de cause inconnue • Maux de tête • Grande fatigue • Douleurs musculaires généralisées • Perte d'appétit importante • Nausées ou vomissements • Maux de ventre • Diarrhée 		
Si OUI, l'utilisateur doit porter le masque de procédure et utiliser l'aire réservée aux usagers ayant des symptômes. Le TdeS doit appliquer les précautions additionnelles requises.			
Avez-vous la COVID¹?	<p>Si oui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioriser les rendez-vous en fin d'avant-midi ou d'après-midi si possible • Demander à l'utilisateur d'arriver à l'heure prévue de son rendez-vous • Demander à l'utilisateur de mettre un masque de procédure en arrivant et de se laver les mains 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Diriger l'utilisateur à la salle d'examen à son arrivée si possible • Le TdeS doit appliquer les précautions additionnelles requises 		
Êtes-vous un contact étroit ?	<p>Dans les 7 derniers jours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact avec un cas de COVID-19 confirmé ou suspecté à moins de 2 mètres et pendant plus de 10 minutes 		
Si OUI, l'utilisateur doit porter le masque de procédure et utiliser l'aire réservée aux usagers ayant des symptômes. Le TdeS doit appliquer les précautions additionnelles requises.			

ROUGEOLE		Oui	Non
Avez-vous UN ou PLUSIEURS des symptômes suivants ?	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre $\geq 38,3$ °C (101 °F); <li style="text-align: center;">ET • Toux ou coryza ou conjonctivite ; <li style="text-align: center;">ET • Éruption maculopapulaire généralisée 		
Êtes-vous un cas ou le contact d'un cas ?	<p>Êtes-vous un contact étroit (21 derniers jours) d'un cas confirmé de rougeole ?</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>Avez-vous reçu récemment des directives de la part d'une autorité compétente, telle que la direction de la santé publique, vous recommandant de prendre des précautions pour éviter la transmission de la rougeole ?</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>Avez-vous reçu un diagnostic de rougeole dans les 4 derniers jours ?</p>		
SI OUI aux questions précédentes	Aviser la PCI		
<p>Si OUI, l'utilisateur doit porter le masque de procédure et l'installer dans une salle à pression négative. En l'absence d'une pièce à pression négative, une pièce fermée avec un nombre élevé de changements d'air par heure peut être utilisée.</p> <p>Le TdeS doit appliquer les précautions additionnelles de types aériennes contact renforcés (B-G-M N95 et visière jetable)</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Faire porter un masque de procédure à l'utilisateur ou lui faire laver les mains • Si possible reporter le rendez-vous • Sinon, prioriser les rendez-vous en fin d'avant-midi ou d'après-midi si possible • Demander à l'utilisateur d'arriver à l'heure prévue de son rendez-vous • Demander à l'utilisateur de mettre un masque de procédure en arrivant dans l'établissement et de se laver les mains • Diriger l'utilisateur à la salle d'examen DÈS son arrivée • Le TdeS doit appliquer les précautions additionnelles de type aériennes contact renforcé (B-G-M N95 et visière jetable) 		
	Attendre le changement d'air à l'heure et la désinfection avant de réutiliser le local		
<p>Si OUI, l'utilisateur doit porter le masque de procédure et l'installer dans une salle à pression négative. En l'absence d'une pièce à pression négative, une pièce fermée avec un nombre élevé de changements d'air par heure peut être utilisée.</p> <p>Le TdeS doit appliquer les précautions additionnelles de types aériennes contact renforcé (B-G-M N95 et visière jetable)</p>			

Références COVID :

<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2907-prevention-controle-infections-cliniques-medicales-externes-gmf.pdf>

[SRAS-CoV-2 : Définitions des termes en prévention et contrôle des infections dans les milieux de soins | Institut national de santé publique du Québec \(inspq.qc.ca\)](#)

[Outil d'aide à la décision pour les maladies infectieuses lors de l'arrivée des usagers aux services d'urgence \(gouv.qc.ca\)](#)

1. Usager ayant eu la COVID-19 depuis plus que 10 jours ou plus de 21 jours chez ceux immunosupprimés, aucune mesure nécessaire.
2. Pour les consignes concernant le port du masque par le personnel, vous référer à la recommandation suivante : <http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/outils-cliniques/>

Références ROUGEOLE :

Fiche technique pour la gestion des cas, des contacts et des éclosions. Rougeole. Février 2024.
<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2023/23-271-07W.pdf>

Rougeole. Appel à la vigilance. Direction de santé publique. Le 4 mars 2024.

Liens utiles supplémentaires :

Affiche Alerte ! Rougeole ! <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-34W.pdf>

Éclosion rougeole - MSSH <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/rougeole/eclosion-de-rougeole>

Maladies éruptives, purpuras et dermites de l'enfant, CHU Ste-Justine <https://www.urgencehsj.ca/wp-content/uploads/EruptionsPurpuras.pdf>

Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/>